



Acetaminophen
Diphenhydramine HCl
Phenylephrine HCl

Acetaminophen

استامینوفن

استامینوفن
دیفن هیدرامین هیدرو کلرايد
فنتیل افرین هیدرو کلرايد

شربت کوربیزان® کودکان سرماخوردگی و آنفلوآنزا به صورت شربت خوارکی، تقریباً بی رنگ تا گل بهی و با طعم و بوی انگور می باشد. هر ۵ میلی لیتر شربت حاوی ۱۶۰ میلی گرم استامینوفن، ۱۲/۵ میلی گرم دیفن هیدرامین هیدرو کلرايد و ۲/۵ میلی گرم فنتیل افرین هیدرو کلرايد است و در بطری های ۱۲۰ میلی لیتری درون جعبه توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می شود.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

۱- وجود هرگونه حساسیت ۲- بارداری یا شیردهی ۳- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

- ۱- سابقه حساسیت به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو
- ۲- نوزادان تازه متولد شده یا نارس
- ۳- حملات آسمی
- ۴- افزایش شدید فشار خون، بیماری شدید عروق خونی قلب، ضربان سریع قلب، بیماریهای شدید قلبی
- ۵- اشکال در دفع ادرار
- ۶- مصرف همزمان و یا در طی ۱۴ روز اخیر با فورازولیدون یا داروهای مهار کننده منوآمین اکسیداز مانند فنلزین

صرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - بنظر نمی رسد مصرف موردي این دارو باعث بروز مشکلات در جنبین یا نوزاد تازه متولد شده گردد، اگرچه مصرف مقادیر بیشتر و یا به مدت طولانی احتمال بروز خطر را افزایش می دهد. مصرف این دارو با نظر پزشک در دوران بارداری مجاز است.

شیردهی - این دارو در شیر مادر ترشح می شود و ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته مانند هیجان یا تحریک پذیری غیرعادی در کودک شیرخوار گردد، ضمن آن که ممکن است جریان شیر را نیز کاهش دهد. بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

هشدارها:

۱- کودکان با سن بسیار پایین معمولاً به اثرات این دارو بیشتر حساس می باشند. احتمال بروز کابوس های شبانه، هیجان غیرعادی، عصبانیت، بیقراری یا تحریک پذیری و افزایش فشار خون در کودکان بیشتر است.

۲- افراد مسن معمولاً به عوارض این دارو بیشتر حساس می باشند. اغتشاش شعور، توهمات، اشکال در دفع ادرار یا ادرار کردن دردناک، گیجی، خواب آلودگی، حملات تشنجی، افزایش فشار خون، احساس از حال رفتن، خشکی دهان، بینی و گلو، کابوس های شبانه یا هیجان غیرعادی، عصبانیت، بیقراری یا تحریک پذیری ممکن است بیشتر در افراد مسن بروز نماید.

۳- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تاثیر بگذارد. در صورت ابتلا به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:

سابقه اعتیاد به الكل - استامینوفن موجود در این دارو احتمال آسیب کبدی را افزایش می دهد.
آسم، آرژی ها، پولیپ های بینی یا ساقه آن و حملات آسمی - اگرچه مصرف دیفن هیدرامین باعث باز شدن مجاری نایزه ای می گردد، اما به دلیل سایر اثرات ممکن است منجر به غلظت شدن ترشحات شود. در این شرایط خروج ترشحات با اشکال انجمام می گیرد.

بیماری قند (دیابت ملیتوس) - فنتیل افرین موجود در این دارو ممکن است خطر بیماریهای قلبی یا عروقی در بیماران مبتلا به بیماری قند را افزایش دهد.
بزرگ شدن پروستات، انسداد دستگاه ادراری یا اشکال در دفع ادرار - برخی اثرات دیفن هیدرامین ممکن است باعث و خامت مشکلات ادراری گردد.

گلوكوم - افزایش مختصر در فشار داخلی چشم ممکن است بروز نماید.
هپاتیت یا سایر بیماریهای کبد - به دلیل احتمال تجمع این دارو در بدن، شانس بروز عوارض جانبی افزایش می یابد.

بیماریهای قلبی یا عروقی و فشار خون بالا - فنتیل افرین موجود در این دارو ممکن است باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب گردد.
بیماری شدید کلیه - اگر دارو به مقدار زیاد و به مدت طولانی مصرف گردد، ممکن است کلیه ها را تحت تأثیر قرار دهد.

پُر کاری غده تیروئید - در پُر کاری غده تیروئید که منجر به ضربان سریع قلب شده است، فنتیل افرین موجود در این دارو ممکن است باعث بیشتر شدن ضربان قلب بیمار گردد.

موارد احتیاط:

۱- نتایج آزمون های پوستی که برای تشخیص آرژی انجام می گیرد، ممکن است تحت تأثیر مصرف این دارو واقع شود. بنابراین لازم است قبل از انجام هر گونه آزمون فوق، پزشک را از مصرف این دارو مطلع نمایید.

۲- در صورت عدم بهبودی عالیم طی ۵ تا ۷ روز از مصرف دارو و یا بدتر شدن آنها و یا مشاهده تب بالا که بیشتر از ۳ روز ادامه یابد، با پزشک خود مشورت نمایید.

۳- در صورت گلودرد شدید و یا گلودردی که بیشتر از ۲ روز ادامه یابد و یا با تب، سردرد، بثورات جلدی، تهوع و استفراغ همراه شود، با پزشک خود مشورت نمایید.

۴- در صورت سوء مصرف الكل؛ مصرف سایر داروهای ضد هیستامین یا داروهای مؤثر بر تب یونجه، سایر آرژی ها و سرماخوردگی ها؛ مسکن ها، آرام بخش ها یا داروهای خواب آور؛ داروهای ضد درد با نسخه یا مخدرهای باربیتووات ها؛ داروهای ضد تشنج؛ شل کننده های عضلانی؛ داروهای بیهوشی شامل بی حس کننده های دندان با پزشک معالج خود مشورت کنید.

۵- مصرف همزمان این دارو با مقادیر زیاد نوشابه های حاوی الكل ممکن است باعث آسیب کبدی شود.

۶- این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی، گیجی، تاری دید و کم شدن هوشیاری در برخی افراد شود، لذا ضمن درمان از کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند

- ۷- این دارو ممکن است باعث عصبانیت، بیقراری یا اشکال در به خواب رفتن در برخی افراد گردد. در صورت اشکال در به خواب رفتن، آخرین نوبت مصرف روزانه این دارو را چند ساعت قبل از زمان خواب مصرف نمایید.
- ۸- این دارو ممکن است اثرات تحریکی داروهای رژیمی بر روی سیستم عصبی مرکزی را افزایش دهد. لذا از مصرف همزمان این دارو با داروهای رژیمی یا کنترل کننده آشتها، بدون تجویز پزشک خودداری نمایید.
- ۹- قبل از انجام هر گونه عمل جراحی (شامل جراحی دندان) و یا سایر درمان‌های فوریت دار پزشکی، پزشک یا دندانپزشک خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.
- ۱۰- این دارو ممکن است باعث خشکی دهان، بینی و گلو گردد. برای تسکین موقت خشکی دهان می‌توان از آب نبات یا آدامس بدون قند، ذوب تکه‌های یخ در دهان و یا جاشین‌های براق استفاده نمود. در صورت تداوم خشکی دهان به مدت بیشتر از ۲ هفته، دندانپزشک خود را مطلع نمایید. طولانی شدن خشکی دهان ممکن است منجر به افزایش خطر بیماریهای دندان و لثه و عفونت‌های قارچی گردد.
- ۱۱- مصرف همزمان این دارو با سایر داروهایی که حاوی استامینوفن می‌باشند، ممکن است منجر به مسمومیت گردد.
- ۱۲- این دارو ممکن است باعث حساسیت بیشتر پوست نسبت به نور خورشید شود. در صورت قرار گرفتن به مدت طولانی در برابر نور خورشید، از مواد و یا پوشش محافظت کننده استفاده کنید.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌کنید، پزشک خود را مطلع سازید:

بنتابلوکرها (مانند پروپرانولول)، فورازولیدون، ایندومتاکسین، ایزونیازید، داروهای مهار کننده منوآمین اکسیداز (مانند فنلزین)، داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای (مانند آمی تریپتیلین) – این داروها ممکن است باعث افزایش احتمال بروز عوارض جانبی ناشی از مصرف این شربت گردد.

داروهای ضد انعقاد (مانند وارفارین)، دیگوکسین – احتمال بروز خونریزی، ضربان نامنظم قلب یا حمله قلبی ممکن است افزایش یابد.

بروموکریپتین یا داروهای هیدانتوئینی (مانند فنی توئین) – احتمال بروز عوارض جانبی این داروها ممکن است افزایش یابد.

گوانادرل، گوتاکیدین، مکامیل آمین، متیل دوپا، رزپین – در مصرف همزمان، اثربخشی این داروها ممکن است کاهش یابد.

مقدار و نحوه مصرف دارو :

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو بهطور کلی بهصورت زیر است:
- کودکان ۶ تا ۱۱ سال – ۲ قاشق مرباخوری (۱۰ میلی لیتر) هر ۴ ساعت یک بار در صورت نیاز است. مقدار مصرف نباید بیشتر از ۵ نوبت در روز باشد.
- کودکان کمتر از ۶ سال – مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین شود.
- درخصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:
- این دارو را فقط براساس دستور پزشک یا راهنمای دارو مصرف نمایید. از مصرف مقادیر یا دفعات بیشتر از دستور راهنمای دارو خودداری نمایید.
 - این دارو را می‌توان همراه با غذا یا با معده خالی مصرف نمود.
 - از پیمانه همراه با این دارو برای اندازه‌گیری مقدار مصرف استفاده نمایید.
 - در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عواض جانبی :

هر دارو به موزات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه با مصرف مقادیر توصیه شده این دارو بندرت عوارض جانبی جدی بروز می‌نماید. احتمال بروز عوارض جانبی در شرایطی است که دارو در مقادیر بسیار زیاد و به مدت طولانی مصرف شود.

در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

بیشتر شایع – بیوست؛ اسهال؛ گیجی؛ خواب آلودگی؛ تحریک پذیری؛ سردرد؛ کاهش اشتها؛ تهوع؛ استفراغ؛ عصبانیت یا اضطراب؛ اشکال در به خواب رفتن؛ دل بهم خوردگی؛ ضعف.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارض جانبی شدید مانند واکنش‌های شدید آлерژیک (بثورات جلدی، کهیر، خارش، اشکال در تنفس، احساس تنگی نفس، تورم دهان، صورت، لبها یا زبان)، ادرار تیره رنگ؛ اشکال در ادرار کردن یا عدم توانایی در دفع ادرار؛ ضربان سریع یا نامنظم قلب؛ تغییرات رفتاری یا خلائق؛ مدفوع رنگ پریده؛ حملات تشنجی؛ خواب آلودگی شدید؛ گیجی شدید یا مداوم؛ عصبانیت، منگی یا سردرد؛ اشکال شدید یا مداوم در به خواب رفتن؛ درد معده؛ لرزش؛ تغییرات بینایی و زرد شدن پوست یا چشم‌ها با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه – در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علایمی نظیر تاری دید؛ اغتشاش شعور؛ توه؛ حملات تشنجی؛ گیجی شدید، منگی یا سردرد؛ خواب آلودگی شدید؛ ضربان سریع، کند یا نامنظم قلب و استفراغ، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از سرما و نور نگهداری کنید.
- دارو از بخ زدگی محافظت گردد.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
 (جاده مخصوص کرج) ، بلوار عبیدی، پلاک ۲۲، داروسازی دکتر عبیدی
 صندوق پستی: ۱۳۴۴۵ - ۱۵۶

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹
 دورنگار: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۴۷۸۷ شماره ارسال پیام کوتاه (SMS) : ۳۰۰۰۴۹۲۹
 ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com

پست الکترونیک: info@abidipharma.com
 سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

تاریخ ویرایش : ۹۶/۰۵/۲۳

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبدالرضا

تأسیس ۱۳۲۵

